



ČOLCI

Rosolovitý obal vajíčka oválný; vajíčka uložena jednotlivě; vajíčka obvykle zabalena do lístků vodních rostlin.

Velká, jednobarevná vajíčka; bílá, bělavá až žlutavá; podélný průměr vajíčka 2–3 mm, s rosolovitým obalem 4–5 mm **čolek velký, č. dravý, č. dunajský**



Menší, dvoubarevná vajíčka; horní polovina u čerstvých vajíček většinou hnědá až hnědookrová, spodní polovina bílá, bělavá až žlutavá; podélný průměr vajíčka 1,3–1,8 mm, s rosolovitým obalem 2–3,7 mm (obvykle do 3 mm) **čolek obecný, č. hranatý, č. karpatský, č. horský**



ŽÁBY

Rosolovitý obal vajíčka kulovitý; vajíčka uložena jen výjimečně jednotlivě, spíše v menších či větších skupinkách nebo v provazcích, vajíčka nejsou zabalena do lístků vodních rostlin


KUŇKY

Vajíčka jednotlivě, nebo v malých skupinkách do 40 ks vajíček, velikost nejvýše vlašského ořechu (max. 4 cm) Pozn.: obtížně rozlišitelná skupina


Vajíčka v malých skupinkách do 30 ks vajíček (výjimečně až 40 ks, ale i jednotlivě) pevně přichycená na různé části rostlin či větvičky; čerstvá vajíčka dvoubarevná, horní polovina hnědá, spodní bělavá, okrová až žlutavá (později vajíčka

jednobarevná, hnědá až šedohnědá); průměr vajíčka 1,5–2 mm, s rosolovitým obalem 5–8 mm

Snůšky pevné (tuhé rosolovité obaly), obvykle hroznovitého až řetízkovitého tvaru; rosolovité obaly vajíček od sebe zřetelně rozlišitelné **kuňka žlutobřichá**




Snůšky měkké (řidké rosolovité obaly), hroznovitého tvaru jen výjimečně; rosolovité obaly vajíček často spojené v jeden celek **kuňka ohnivá (obecná)**



ROSNIČKA

Obvykle 40-100 kusů vajíček ve snůšce (výjimečně i výrazně méně); obvykle uchycené okolo stébel nebo jiných částí vodních rostlin; čerstvá vajíčka dvoubarevná, horní část světle hnědá, spodní většinou nápadně světlá, bílá (později vajíčka jednobarevná, okrová až světle hnědá); průměr vajíčka 1-1,5 mm, s rosolovitým obalem 3–4 mm **rosnička zelená**




SKOKANI

50-100 kusů vajíček ve snůšce; snůšky uchycené k různým částem vodní vegetace jen svým okrajem nebo volně uložené; průměr vajíčka 1–2,8 mm, s rosolovitým obalem 6–11 mm

ZELENÍ SKOKANI


Shluky měkké (řídce rosolovité obaly), vždy nepravidelného tvaru, snůšky vždy přichycené k vodní vegetaci; rosolovité obaly vajíček často propojené v jeden celek; čerstvá vajíčka zřetelně dvoubarvá, horní polovina hnědá, spodní bělavá, krémová až žlutavá (později vajíčka jednobarevná, světle hnědá); snůšky obvykle uchycené k různým částem vodní vegetace jen svým okrajem; průměr vajíčka 1–2,5 mm, s rosolovitým obalem 6–8 mm **skokan krátkonohý, s. skřehotavý, s. zelený**



HNĚDÍ SKOKANI

Shluky pevné (tuhé rosolovité obaly), pravidelného nebo nepravidelného tvaru; snůšky přichycené k vodní vegetaci nebo volně uložené; rosolovité obaly vajíček zřetelně od sebe rozlišitelné; horní polovina vajíček tmavě hnědá, spodní polovina celá světlá nebo alespoň částečně světlá .

Snůšky obvykle volně uložené, nepřichycené k vegetaci, nepravidelného tvaru; uloženy obvykle ve velkých seskupeních v nejmělkších částech litorálů vodních těles (někdy mohou ležet i jednotlivě volně na dně); rosolovité obaly vajíček obvykle lehce mléčně zakalené se stříbřitým leskem na okrajích snůšky; průměr vajíčka 1,6–2,8 mm, s rosolovitým obalem 8–11 mm; čerstvá vajíčka tmavě hnědá, naspodu je bílá až bělavá skvrna (později vajíčka jednobarevná, tmavě hnědá); obvykle 500 až 2 000 vajíček ve snůšce; průměr snůšky obvykle 10–20 cm **skokan hnědý**



ROPUCHY


Tenké provazce (šňůry) vajíček 1–5 m dlouhé a široké pouze 4–8 mm; vajíčka uložena v provazci v 1–4 pravidelných řadách; čerstvá vajíčka černá nebo černohnědá, se světlejší spodní částí (později vajíčka jednobarevná, černohnědá)

Provazec maximálně 2 m dlouhý (obvykle do 1 m); vajíčka v provazci v 1–2 řadách; provazce vajíček obvykle uloženy volně na dně mělkých vodních těles; průměr vajíčka 1–1,7 mm, s rosolovitým obalem 4–6 mm; do 4 000 vajíček ve snůšce **ropucha krátkonohá**

Provazec obvykle 2 a více metrů dlouhý; vajíčka v provazci v 1–4 řadách

Provazce vajíček uložené volně na dně či přichycené k vegetaci nebo jiným předmětům ve vodě; průměr vajíčka 1–1,5 mm, s rosolovitým obalem 4–6 mm; obvykle do 6 000 vajíček ve snůšce; vajíčka v 1–3 řadách **ropucha zelená**

Provazce vajíček obvykle propleteny mezi vegetací a jinými předměty ve vodě; období výskytu časně jaro; průměr vajíčka 1,5–2 mm, s rosolovitým obalem 4–8 mm; do 8 000 vajíček ve snůšce; vajíčka obvykle ve 2–4 řadách **ropucha obecná**



BLATNICE

Tlusté provazce (pásy) vajíček obvykle do 1 m délky a 15–30 mm šířky; vajíčka uložena v rosolovitém pásu v 5–10 nepravidelných řadách; horní polovina čerstvých vajíček obvykle tmavě hnědá až šedohnědá, spodní bělavá (později vajíčka jednobarevná, hnědá); pásy vajíček propleteny mezi vodními rostlinami či omotány kolem stvolu; průměr vajíčka 1,7–2 mm; do 7 000 vajíček ve snůšce (spíše méně); pás vajíček se často rozpadá na menší části **blatnice skvrnitá**

